

MYASTHENIA GRAVIS

ZDRAVOTNÁ INFORMAČNÁ KARTIČKA

Lieky, ktoré sa nesmú brať pri MG, alebo ich treba brať so zvýšenou pozornosťou

Meno _____

Adresa _____

Mesto _____ Štát _____ PSČ _____

Telefón (_____) _____ alebo (_____) _____

Dátum narodenia _____

V prípade potreby kontaktujte::

Meno _____

Telefón (_____) _____ alebo (_____) _____

Iné zdravotné ťažkosti:

Lieky, ktoré v súčasnosti užívam:

LIEKY, KTORÉ SA NESMÚ BRAŤ, ALEBO SA MUSIA BRAŤ SO ZVÝŠENOU POZORNOSŤOU PRI MYASTHENII GRAVIS (MG)

- > Penicilamin a interferon alfa by sa nemali používať u pacientov s MG.
Botulotoxin sa u pacientov s MG nesmie používať.
- > Zvýšenú slabosť vykazujú pacienti s MG pri užívaní týchto liekov;
používať ich pri liečbe iba so zvýšenou pozornosťou a pozorným sledovaním MG symptómov:

- Nedepolarizujúce kurariformné periférne svalové relaxanty
- anxiolytika: diazepam
- vybrané antibiotiká, relaxačné účinky majú aminoglycosidy a ciprofloxacín (*Poznámka:* Mnoho ďalších antibiotík spôsobuje zvýšenú slabosť u pacientov s MG)
- betablokátory (propranolol, timolol očné kvapky)
- blokátory kalciových kanálov
- antiarytmika: chinidín, propafenon

Je mnoho ďalších liekov u ktorých bola preukázaná zvýšená slabosť u pacientov s MG. Lekári a pacienti s MG by mali venovať vyššiu pozornosť tejto možnosti pri začatí užívania nového lieku.

Ak máte otázky týkajúce sa liekov, kontaktujte môjho MG lekára:

Meno _____

Telefón (_____) _____ alebo (_____) _____

**Viac informácií nájdete na web stránkach www.myasthenia.org
www.myasthenia.sk**